

Артродарин®

Диациреин капсулы 50 мг

Регистрационный номер – ЛСР-005403/08

СОСТАВ

Активное вещество – диациреин. 1 капсула содержит 50 мг активного вещества. *Вспомогательные вещества* – лактоза моногидрат, кроскармеллезы натриевая соль, повидон К30, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, индигогин (Е-132), окись железа желтая (Е-172), окись титана (Е-171), желатин.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Фармакодинамика. Диациреин ингибирует синтез и активность интерлейкина-1 (ИЛ-1), который играет важную роль в развитии воспаления, дегенерации и последующем разрушении хряща при остеоартрозе. Кроме того, диациреин ингибирует действие других цитокинов, вызывающих воспаление, включая ИЛ-6, ФНО-α. Диациреин также замедляет образование металлопротеиназ (коллагеназа, эластаза), которые участвуют в процессе повреждения хрящевой ткани. При длительном применении диациреин стимулирует синтез протеогликанов и не влияет на синтез простагландинов.

Фармакокинетика. После приема внутрь диациреин быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта и полностью деацетилируется до реина. Одновременный прием препарата с пищей увеличивает биодоступность на 25%. Максимальная концентрация (С_{max}) реина в плазме достигается через 144 минуты. Период полувыведения из плазмы составляет 255 минут. Связь реина с альбумином практически 100%. При однократном приеме 50 мг С_{max} достигает 3,15 мг/л. При многократном приеме препарата С_{max} повышается в связи с кумуляцией препарата. Реин выводится почками в неизменном виде (20%) и в виде глюкуронида (60%) и сульфата (20%). Реин проникает через плацентарный и гематоэнцефалический барьеры.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Первичный и вторичный остеоартроз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата или высокая чувствительность к антрахиноновым препаратам (например, слабительным средствам). Детский возраст (до 18 лет). Беременность, период лактации. **С осторожностью:** пациентам с раздражением нижних отделов кишечника препарат назначается только в особых случаях. Крайне осторожно следует применять препарат и при наличии хронической почечной недостаточности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Стандартный прием по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером, после еды). Капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая, и запивать водой. Эффект от лечения следует ожидать через 2-4 недели.

Артродарин принимается непрерывно длительно или курсами продолжительностью не менее 4 месяцев.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При повышенной чувствительности к компонентам препарата могут отмечаться аллергические реакции различной степени. На начальном периоде приема препарата временно могут иметь место явления со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе. В этом случае дозировка может быть снижена до 1 капсулы в день. В процессе лечения может иметь место интенсивное окрашивание мочи от желтого до коричневого цвета (в зависимости от pH), что не требует снижения дозы (отмены) препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

При передозировке возможна диарея, слабость. В случае передозировки или случайного приема лекарств детьми необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Артродарин не рекомендуется принимать вместе с веществами, оказывающими влияние на качество содержимого кишечника и скорость его опорожнения (например, большое количество клетчатки). Антациды уменьшают абсорбцию препарата. При одновременном приеме с антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами, влияющими на микрофлору кишечника, может повыситься частота нежелательных явлений со стороны кишечника.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Продолжительность лечения в зависимости от достигнутого результата может быть длительной. В период, предшествующий развитию терапевтического эффекта, Артродарин можно принимать одновременно с анальгетиками и нестероидными противовоспалительными препаратами. Необходим периодический контроль показателей крови, печеночных ферментов, мочи. При ухудшении функции почек врач должен снизить дозу препарата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте.

ПОРЯДОК ОТПУСКА

Препарат отпускается по рецепту.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

TRB PHARMA SA (Argentina) for TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL SA
Rue Michel-Servet 12, P.O. Box 352, CH-1211, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 703 49 00 Fax +41 22 703 49 01
e-mail: rheumatology@trbchemedica.com www.trbchemedica.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ

ТРБ Кемедика Интернешнл
107065, Москва, Алтайская ул., дом 5
www.artrodarin.ru marketing@trbchemedica.ru